

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Caldo Bordelés Vallés® Blue

Fungicida-bactericida cúprico, preventivo y de amplio espectro. Azul

- **Grupos de modo acción (MOA):** Multisitio, inorgánico sal de Cu.
- **Composición:** Sulfato cuprocálcico (expresado en cobre) 20% p/p (200 g/kg).
- **Formulación:** Polvo Mojable (WP) micronizado.
- **Nº Registro:** 13.964

Producto certificado en agricultura ecológica por CAAE.

Su mayor adherencia le da una de sus principales características: LA **PERSISTENCIA**.

APLICACIONES AUTORIZADAS

CULTIVOS	PLAGAS, ENFERMEDADES, MALAS HIERBAS	Dosis en % ó Kg-L/ha	Plazo Seguridad días
Ajos, cebolla y chalote	alternaria, antracnosis, bacteriosis, mildiu	0,6-0,9 %	3
Almendro y avellano	abolladura, bacteriosis, cribado, monilia, moteado	0,5-0,75 %	15
Berenjena y tomate	alternaria, antracnosis, bacteriosis, mildiu	0,6-1 %	3 inver. y 10 campo
Brécol y coliflor	alternaria, antracnosis, bacteriosis, mildiu	0,6-1 %	15
Cítricos	aguado, bacteriosis, fomopsis y otros hongos endófitos	0,2%	15
Cucurbitáceas de piel comestible	alternaria, antracnosis, bacteriosis, mildiu	0,6-0,75 %	3
Cucurbitáceas de piel no comestible	alternaria, antracnosis, bacteriosis, mildiu	0,6-0,75 %	7
Frutales de hueso	abolladura, bacteriosis, cribado, monilia, moteado	0,6-1 %	NP
Frutales de pepita	bacteriosis, monilia, moteado	0,6-1 %	NP
Garbanzo	rabia	0,5-0,75 %	15
Granado	cribado	0,6-1 %	15
Guisantes verdes y habas verdes	alternaria, antracnosis, bacteriosis, mildiu	0,6-1 %	3
Higuera	podredumbre del fruto	0,6-1 %	15
Hortícolas de hoja	alternaria, antracnosis, bacteriosis, mildiu	0,6-1 %	15
Judías verdes	alternaria, antracnosis, bacteriosis, mildiu	0,6-1 %	3
Lúpulo	mildiu	0,6-1 %	15
Nogal	bacteriosis, monilia	0,5-0,75 %	15
Olivo	repilo, tuberculosis	0,6-1 %	15
Ornamentales leñosas	hongos endofitos	0,6-1 %	NP
Patata	alternaria, mildiu	0,6-1 %	15
Pistacho	alternaria, bacteriosis	0,5-0,75 %	15
Tallos jóvenes (excepto espárrago)	alternaria, antracnosis, bacteriosis, mildiu	0,6-1 %	3
Vid	bacteriosis, mildiu	0,6-1 %	15

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

RECOMENDACIONES

Cultivos	Recomendaciones
Berenjena y tomate	<ul style="list-style-type: none"> • Efectuar un máximo de 6 aplicaciones por campaña, a intervalos de 7 días. • Utilizar un volumen máximo de caldo de 600 L/Ha. • Utilizar un máximo de 7,5 Kg de Cu/ha y por campaña.
Frutales de hueso y de pepita	<ul style="list-style-type: none"> • Efectuar sólo tratamientos desde la cosecha hasta la floración. • Utilizar un volumen máximo de caldo de 1.200 L/Ha. • Realizar un máximo de 3 aplicaciones por campaña. • El intervalo de tratamientos será de 14 días. • Utilizar un máximo de 7,5 Kg de Cu/ha y por campaña.

ADVERTENCIAS

- Las recomendaciones e información que les facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos.
- Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.).
- La Compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.

¡IMPORTANTE!

- ✓ Para cualquier aclaración y para el correcto uso de los productos IQV, deberá consultar y seguir la información autorizada e impresa en la **etiqueta** de cada uno de los envases del producto a usar.
- ✓ Deberá consultarse, también, la Ficha de Datos de Seguridad (**SDS**) del producto.
- ✓ Las **dosis** son orientativas y pueden variar según sean los cultivos y la intensidad del problema a combatir.
- ✓ En la siguiente **web** del Ministerio de Agricultura puede consultar, con el nº de registro, la información del producto:

<http://www.mapama.gob.es/es/agricultura/temas/sanidad-vegetal/productos-fitosanitarios/registro/productos/conregnom.asp>

