



# Relevant-Oil®



Insecticida-Acaricida.

Capacidad

Composición	Sales potásicas de ácidos grasos vegetales ... 13,04% p/v (130,4 g/L)
Formulación	(SL) - Concentrado soluble
Nº Registro	ES-00603

### CARACTERÍSTICAS

Relevant-Oil® es un insecticida/acaricida que actúa exclusivamente por contacto, contra larvas y adultos de insectos y ácaros y, en ciertos casos, también contra huevos. Relevant-Oil® posee un modo de acción físico, penetrando en la matriz lipoproteica de las membranas celulares del parásito y perturbando su funcionamiento, lo que provoca una muerte rápida. Relevant-Oil® no posee actividad residual pues se degrada rápidamente y no persiste en el medio ambiente.

### PRECAUCIONES

- Aplicar de preferencia en las horas de menor calor del día (pronto por la mañana o a última hora de la tarde). No pulverizar si el grado de humedad atmosférica es alto.
- Evitar pulverizar si las plantas están sometidas a estrés.
- En pimiento la dosis máxima recomendada es del 1% (1 litro de producto por cada 100 litros de agua). En berenjena la dosis máxima recomendada es del 2,5% (2,5 litros de producto por cada 100 litros de agua). No se requiere regulador de pH en el tratamiento.
- En pimiento puede presentarse cierta sensibilidad al tratamiento, por lo que es conveniente realizar una prueba previa en una pequeña superficie para ajustar el volumen de caldo a utilizar y la dosis.

### APLICACIONES AUTORIZADAS

Tratamientos insecticidas-acaricidas mediante pulverización manual en invernadero, cubriendo toda la superficie de las hojas. Para la mezcla, evitar aguas con alto grado de dureza. Usar agua de lluvia cuando sea posible.

Cultivo	Plaga	Dosis	Nº Aplicaciones (intervalo)	Volumen caldo (L/ha)	Forma y época de aplicación (Condic. específico)
Tomate y Berenjena	Mosca blanca, Aleyrodidae	7,5 - 19 L/ha	4 (7 - 10 días)	500 - 1000	-
Pimiento					
Cucurbitáceas					
Pepino					
Guisante para grano, Guisante proteaginoso/forrajero y Guisante verde					
Haba forrajera y Haba para grano					
Judía forrajera y Judía para grano					
Coliflor	Chinches, heterópteros	7,5 - 19 L/ha	4 (7 - 10 días)	500 - 1000	Aplicar en BBCH 51-85
Acelga*, Ajo*, Albahaca*, Alcachofa*, Apio* (la producción puede estar destinada al consumo de tallos, hojas o semillas), Batata, boniato* (se podrá destinar a producción de hojas), Berza, col*, Brécol*, Cardo*, Cebolleta*, Cebollino*, Col de Bruselas*, Col de China*, Colirrábano*, Endibia* (cultivo de raíces para obtención), Escarola*, Espinaca*, Estragón*, Hinojo* (la producción puede estar destinada al consumo de hojas), Laurel* (exclusivamente para producción de hojas para consumo humano), Lenteja verde*, Nabo* (se podrá destinar a producción de semillas para obtención de aceite), Perejil*, Perifollo*, Puerro*, Remolacha de mesa* (se podrá destinar a producción de hojas), Repollo*, Romero*, Rúcula*, Salvia* y Tomillo*	Trips Polilla del tomate, Tuta absoluta Ácaros				
Arbustos y pequeños árboles ornamentales y Ornamentales herbáceas (plantas ornamentales de interior)	Trips Áfidos, pulgones, Aphididae Cochinilla Ácaros	15 - 19 L/ha		1000	-

**\*Usos menores:** cultivos autorizados siguiendo el procedimiento de los usos menores (Art. 51.5 Reglamento (CE) 1107/2009). La responsabilidad en relación a la fitotoxicidad y los fallos de eficacia del producto, en estos cultivos, recae sobre la persona que utilice el producto fitosanitario.